

农作物病虫情报

第十一期

(2020 年 9 月 25 日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2212292

地址: 开平市长沙良园路 60 号

Email: kpscbz@163.com

晚稻中后期主要病虫害防治意见

据我中心 9 月 24-25 日到蚬冈、金鸡、赤水、月山、水口、长沙、沙塘、龙胜、马冈和苍城等镇(街)调查发现,目前我市水稻个别田块破口扬花,将于 10 月初全面进入破口期。当前我市水稻病虫害属中等、局部重发生,主要发生病虫害为稻纵卷叶螟。

一、稻纵卷叶螟,属中等、局部重发生,田间虫态以蛹和成虫为主。发生严重的金鸡镇和赤水镇,个别田块成虫量达 6000 头/亩。其中,蚬冈镇蚬北村卷叶率 0.1%-0.2%,金鸡镇高镇村卷叶率 1%-5%,金鸡镇江背村卷叶率 10%-20%,赤水镇和安村卷叶率 10%-20%,月山镇横江村卷叶率 0.5%-20%,水口镇新风村卷叶率 10%,长沙街道西溪村卷叶率 1%-5%,沙塘镇西村村卷叶率 1%,龙胜镇现龙村卷叶率 1%-5%,马冈镇高园村卷叶率 1%-5%,马冈镇曲水围村卷叶率 1%-10%,苍城镇潭碧村卷叶率 0.1%。预计第七代稻纵卷叶螟偏重发生,成虫盛发高峰期为 9 月 26-28 日,卵孵发高峰期为 10 月 1-3 日。

二、稻飞虱，属轻发生，但蚬冈镇蚬北村个别防治不佳田块百丛虫量达 5000 头。其中，蚬冈镇蚬北村百丛虫量 1000-5000 头，金鸡镇高镇村百丛虫量 100-250 头，金鸡镇江背村百丛虫量 100-300 头，赤水镇和安村百丛虫量 150-400 头，月山镇横江村百丛虫量 100-400 头，水口镇新风村百丛虫量 150-300 头，长沙街道西溪村百丛虫量 100-300 头，沙塘镇西村村百丛虫量 200-400 头，龙胜镇现龙村百丛虫量 150-300 头，马冈镇高园村百丛虫量 200-500 头，马冈镇曲水围村百丛虫量 300-500 头；苍城镇潭碧村百丛虫量 100-300 头。

三、纹枯病，属轻发生，但蚬冈镇蚬北村个别防治不佳田块病丛率达 90%。其中，蚬冈镇蚬北村病丛率 20%-90%，金鸡镇高镇村病丛率 3%-5%，金鸡镇江背村病丛率 5%-8%，赤水镇和安村病丛率 5%-10%，月山镇横江村病丛率 3%-10%，水口镇新风村卷叶率 8%-10%，长沙街道西溪村病丛率 3%-8%，沙塘镇西村村病丛率 5%-10%，龙胜镇现龙村病丛率 5%-8%，马冈镇高园村病丛率 5%-9%，马冈镇曲水围村病丛率 5%-10%，苍城镇潭碧村病丛率 3%-5%。

四、稻瘟病，属轻发生，历史病区个别稻田已发病。稻瘟病发病田块及历史病区应及时施药，做好破口期及齐穗期预防工作。

五、粘虫、稻苞虫和草地贪夜蛾，警惕爆发为害水稻。近段时间，开平和新会发现粘虫为害水稻，开平发现稻苞虫为害水稻，台山和恩平发现草地贪夜蛾为害水稻。各镇应切实做好调查监测，谨防爆发为害。

六、防治意见

（一）本次防治以稻纵卷叶螟为主，挑治稻飞虱和纹枯病，瘟病发病田块及历史病区应及时预防稻瘟病。随着冷空气的南下，华南将会持续多雨，谨防“两迁害虫”的迁入为害，严防纹枯病爆发为害。

同时各镇应加强对粘虫、稻苞虫和草地贪夜蛾的监测及防控，严防爆发为害，确保粮食生产安全。

（二）防治适期为 10 月 1-3 日，各地可将时间适当提前或延后，以避开破口期施药。

（三）推荐使用配方（亩用药量）

1.防治稻纵卷叶螟、粘虫、稻苞虫及草地贪夜蛾，使用 10%四氯虫酰胺 20 克、或 6%乙基多杀菌素 30 毫升、或 15%茚虫威 12 毫升、或 20%氯虫苯甲酰胺 10 克、或 5%甲维盐 100 毫升、或 1.8%阿维菌素 100 毫升等；

2.防治稻飞虱，使用 10%三氟苯嘧啶 10 毫升、或 25%噻嗪酮 40 克、或 25%噻虫嗪 4 克、或 25%烯啶虫胺 20 克、或 25%吡蚜酮 20 克等；

3.防治纹枯病，使用 19%啶氧·丙环唑 67 毫升、或 32.5%嘧菌酯·苯醚甲环唑 30 毫升、或 30%苯醚甲环唑·丙环唑 15 毫升、或 50%噻呋·己唑醇 10 克、或 20%井冈霉素 50 克等；

4.防治稻瘟病，使用 75%三环唑可湿性粉剂 30 克、或 40%稻瘟灵 80 毫升等；

以上药剂兑水 70 公斤均匀喷施，药后 6 小时内遇中雨以上要及时补施。