

农作物病虫害情报

第八期

(2025 年 9 月 9 日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 0750-2303539

地址: 开平市长沙良园路 60 号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

台风后水稻病虫害防治意见

受今年第 16 号台风“塔巴”影响，我市普降大雨至特大暴雨，并伴随强阵风，个别稻田受浸。我市大部分稻田处于分蘖末期至封行期，但个别迟植田处于返青分蘖期。大风大雨天气易造成稻株损伤，水浸稻田影响稻株生长发育，有利于病虫螺害发生蔓延。

一、螺害，预计局部中等发生。近日降雨频繁，短时雨量较大，个别稻田受浸，福寿螺易随渠水流入稻田为害。重点加强受浸田、低洼田及迟植田调查，发生福寿螺为害，应立即排水施药，尽早补苗及追施分蘖肥。

二、病害，预计中等发生。据 8 月下旬及台风后调查，纹枯病、白叶枯病发生较轻，细菌性条斑病、稻瘟病未见发现为害。但随着气温逐渐升高，以及台风期间造成稻株损伤，须严防病害爆发流行。

三、虫害，预计中等发生。据 8 月下旬及台风后调查，早植田为主发类型田，重点防治对象为稻飞虱、稻纵卷叶螟。虽智能虫情监测数据显示未发现两迁害虫迁入峰，大田虫量新增不多，但迟植田仍需做好田间调查，决定是否应施药及施药日期。

四、本次防治结合封行期防治意见，以纹枯病为主，挑治稻飞虱、稻纵卷叶螟、钻蛀性螟虫、白叶枯、细菌性条斑病、福寿螺，稻瘟病发病田块及历史稻瘟病区做好稻瘟病预防工作。各镇（街）应加强病虫螺害调查，已施药稻田结合病虫螺发生情况决定是否施药，应施未施封行药稻田尽早施药。施药亩用量建议如下：

1.防治稻飞虱、叶蝉、稻粉虱，使用 10%三氟苯嘧啶 10 毫升、或 25%烯啶虫胺 20 克、或 25%吡蚜酮 20 克、或 25%噻虫嗪 4 克、或 25%噻嗪酮 40 克。

2.防治稻纵卷叶螟、钻蛀性螟虫，使用 20%四唑虫酰胺 10 毫升、或 10%四氯虫酰胺 20 克、或 6%乙基多杀菌素 30 毫升、或 15%茚虫威 12 毫升、或 5%甲维盐 100 毫升、或 1.8%阿维菌素 100 毫升。

3.防治纹枯病，使用 19%啉氧·丙环唑 67 毫升、或 32.5%嘧菌酯·苯醚甲环唑 30 毫升、或 30%苯醚甲环唑·丙环唑 15 毫升、或 50%噻呋·己唑醇 10 克、或 20%井冈霉素 50 克。

4.防治稻瘟病、胡麻叶斑病，使用 9%吡唑醚菌酯 60 克、或 50%嘧菌酯 40 克、或 75%三环唑 30 克、或 40%稻瘟灵 80 毫升、或 20%春雷霉素 15 克。

5.防治白叶枯病、细菌性条斑病，使用 20%噻菌铜 100 克、或 20%噻唑锌 120mL、或 20%噻森铜 120-130 克、或 20%叶枯唑 100 克。

6.防治福寿螺，使用 6%四聚乙醛 500g、或 50%杀螺胺乙醇胺盐 80 克、或 5%阿维菌素 100ml。

7.防治水稻中后期杂草，使用 2.5%五氟磺草胺 50 毫升+10%氰氟草酯 50 毫升。

注意事项：每年 9-11 月为红火蚁秋季统一防控行动时期，请各镇（街）落实全面开展统一防控行动。