

# 农作物病虫害情报

## 第六期

(2026年6月8日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 0750-2303539

地址: 开平市长沙良园路60号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

### 警惕迟植田稻纵卷叶螟暴发为害

根据早稻生育期调查,早植田已进入齐穗期,个别迟植田尚未扬花抽穗。结合田间调查与智能测报设备数据,预测稻纵卷叶螟羽化高峰期为6月5-7日,下一代主发类型田为迟植田。对于尚未施药的迟植田,尤其是与早植田相邻的,应重点加强稻纵卷叶螟的调查与防治,谨防其暴发成灾。

近日田间调查显示,稻纵卷叶螟总体为害较轻,但个别防效不佳的早植田亩蛾量仍高达上万头。各监测点智能测报设备数据表明,早植田集中的田垌每日单灯虫量最高:塘口镇重点监测点达1336头,羊路村一般监测点最高591头。预测稻纵卷叶螟卵孵化高峰期为6月10-12日,迟植田暴发为害风险较高。

本次防治以稻纵卷叶螟为主,如发现其他病虫害达到防治指标,可一并施药,防治适期为6月10-12日。建议尚未施药的迟植田,特别是与早植田相邻的,严格按防治适期施药;近期已施药的田块,可根据病虫害发生情况酌情决定是否再次施药。防治稻纵卷叶螟的亩用量建议:使用10%四氯虫酰胺20克、或6%乙基多杀菌素30毫升、或15%茚虫威12毫升、或20%氯虫苯甲酰胺10克、或5%甲维盐100毫升、或1.8%阿维菌素100毫升。

请各镇(街)于3-5、9-11月落实红火蚁统一防控行动。