

农作物病虫害情报

第七期

(2026 年 7 月 22 日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 0750-2303539

地址: 开平市长沙良园路 60 号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

晚稻稻瘟病感病品种（组合）风险预警及防治意见

根据省农业有害生物预警防控中心《2025 年晚造稻瘟病病菌小种监测结果及 2026 年晚稻稻瘟病感病品种（组合）风险预警》，结合我市品种布局和稻瘟病发生情况等综合分析，提出 2026 年我市晚稻稻瘟病感病品种（组合）风险预警及防治意见如下：

一、感病品种（组合）

马坝银占、美香占 2 号、珍桂矮等品种（组合）在我省多个地区种植表现感病。

二、潜在感病风险品种（组合）

1. 珍桂矮、马坝银占、19 香、青香优 19 香等品种大部分稻区种植感病风险极高。

2. 五优 308、象牙香占、合美占、黄华占、美香占 2 号、金农丝苗、玉香油占、天优 998、天优 3618、吉丰优 1002 等品种种植潜在较大风险。

3. 粤农丝苗、粤禾丝苗、五山丝苗、粤晶丝苗 2 号、黄广油占、黄莉占、南晶香占等品种种植潜在一定风险。

请各镇（街）于 3-5、9-11 月落实红火蚁统一防控行动。

三、种苗管理

品种抗性是决定稻瘟病是否发生及流行程度最核心的内在因素。各地应根据稻瘟病感病品种（组合）风险预警，指导农户做好今年晚稻品种布局，引导农户不种或少种感病品种（组合）和潜在风险感病品种（组合）。稻瘟病近年发病田块及历史病区应选用高（耐）抗品种，坚决淘汰感病、种性来源不明的品种，降低病害流行风险。播种前加强种子消毒，插植后加强栽培管理，提高植株抗病能力。同时，切实加强稻瘟病监测预警和防控工作，做到早发现、早预警、早防控，坚决遏制稻瘟病扩散流行，确保晚稻生产安全。

四、大田防病

天气是稻瘟病流行的“催化剂”，直接决定病害的爆发程度。昼夜温差大的阴雨天气，有利于稻瘟病发生蔓延。一旦发现发病中心或急性病斑，应立即施药防控。建议稻瘟病发病田块及历史病区及时采取应对措施，应于移植前 3-5 天、分蘖末期、破口期、齐穗期施药防控。推荐使用农药为三环唑等三唑类杀菌剂、嘧菌酯等甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，建议以上两类农药合理轮换使用，避免长期单一用药导致产生抗药性。

请各镇（街）于 3-5、9-11 月落实红火蚁统一防控行动。