

农作物病虫害情报

第九期

(2026 年 7 月 23 日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 0750-2303539

地址: 开平市长沙良园路 60 号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

晚稻备耕备种植保工作意见

早稻基本已完成收割, 各地陆续开展晚稻备耕备种工作。早稻个别田块出现倒伏, 导致病虫害残存基数较大, 预计晚稻病虫害防控形势严峻。结合我市晚稻种植实际情况, 提出植保工作意见:

一、及早翻犁浸田工作, 加速秸秆腐熟, 破坏水稻病虫害源栖息环境, 降低田间病虫害基数。

二、秧田适时犁翻地、起垄, 垄面沉实 1-2 天后进行田间播种, 重点做好排水防涝工作, 严防积水淹没秧苗。

三、选择优质、高产、抗病品种, 避免在历史感病稻区种植感病品种。去除病谷、空秕谷及各类杂质, 确保稻种颗粒饱满、品质优良。

四、消毒浸种。稻谷用强氯精、碧生、多菌灵、百菌清等配制药液浸泡消毒 4-5 小时, 稻谷再用编织袋包裹, 在清水中浸种 24 小时。

五、拌种催芽。浸种后种子沥干, 在常温下进行堆放催芽, 每隔 3-4 小时检查保证种子温度在 40℃ 以内、表面湿润, 约 10 小时后种

请各镇(街)于 3-5、9-11 月落实红火蚁统一防控行动。

子露白。种子露白后，用吡蚜酮悬浮剂、苯甲·吡虫啉悬浮等种衣剂拌匀，预防苗期稻飞虱、叶蝉等传毒媒介。

六、机插秧苗的人工播种。先将秧盘紧密摆放在秧地上，再铺一层2厘米厚的床土基质并洒水浇透，然后按每盘150-180克的用量均匀撒播种子，最后覆盖一层0.3-0.5厘米厚的覆土基质。

七、防虫网育秧。播种后立即采用20目及以上防虫网覆盖育秧，有效阻隔稻飞虱、叶蝉等传毒媒介，预防南方水稻黑条矮缩病等病毒病。

八、做好移栽前送嫁药工作。秧苗移栽前，可对秧田喷施农药，减少病虫害基数。预防稻纵卷叶螟及钻蛀性螟虫可选用氯虫苯甲酰胺、阿维菌素等药剂，预防稻飞虱可选用三氟苯嘧啶、烯啶虫胺等药剂，预防纹枯病及稻瘟病可选用稻瘟灵、三环唑等药剂。

九、防治福寿螺，减轻为害秧苗。放水办田时，可在进水口设置金属网或尼龙网拦截福寿螺，也可施用四聚乙醛颗粒剂或杀螺胺乙醇胺盐或阿维菌素水乳剂进行防治。

十、大田除草，应选用水田除草剂施药防治。推荐使用丁草胺、吡嘧磺隆、苯噻酰草胺等高效安全稻田除草剂，在返青后进行撒施或喷雾。若前茬是旱作的，要留意旱作除草剂残留对水稻生长的影响。

十一、统一灭鼠，确保秧苗安全。每年8月中旬至9月上旬为我市农区灭鼠的有利时机，全面落实“全方位、五统一”农区灭鼠技术，做到科学选药、配药、投药，开展统一灭鼠行动。推荐使用溴敌隆、大隆、敌鼠钠盐等抗凝血类杀鼠剂，配合新鲜的稻谷、玉米、番薯作饵料，投放毒饵重点区域为秧田、田埂、沟渠。推广使用小包装毒饵投放技术，有条件的地区可推广“毒饵站”投饵、以猫治鼠、围栏捕鼠（TBS）等绿色防控技术。

请各镇（街）于3-5、9-11月落实红火蚁统一防控行动。