

农作物病虫害情报

第十一期

(2026 年 10 月 12 日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 0750-2303539

地址: 开平市长沙良园路 60 号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

晚稻破口期病虫害防治意见

9 月 24、27、29、30 日及 10 月 9 日, 本单位农业技术人员到水口、长沙、塘口、沙塘、苍城、龙胜、马冈、百合、蚬冈、金鸡、赤水等镇(街)下乡调查晚稻病虫害发生动态。大部分稻田正处于抽穗期, 个别早栽田已进入灌浆期。当前病虫害发生程度较轻, 主要病虫害为稻粉虱和纹枯病, 高发田块集中于施药较早的早栽田。综合田间调查、智能测报设备数据及病虫害发生气象因子分析, 预计下一阶段病虫害呈中等发生态势, 但需警惕突发极端天气可能引发的爆发流行风险。

一、稻粉虱, 预计中等发生。调查点稻粉虱优势虫态为高龄若虫, 百丛总虫量一般 100-200 头, 最高达 3000-5000 头(水口黎村、长沙西溪、龙胜和兴、百合儒西、蚬冈风洞、赤水羊路)。稻粉虱属新发、难防性虫害, 应高度重视, 谨防大面积暴发为害。

二、纹枯病, 预计中等发生。调查点纹枯病一般病丛率 10%-20%, 病株率 3%-7%; 高的病丛率 50%-90%, 病株率 10%-20%(水口黎村、龙胜和兴、百合儒西、蚬冈风洞)。为防鼠害, 部分稻田长期渍水, 导致零星稻株倾斜、下部稻叶发黄甚至腐烂, 存在倒伏及病害加重风险。

三、稻飞虱, 预计中等发生。调查点稻飞虱发生较轻, 百丛虫量一般 200-300 头, 优势种为白背飞虱, 优势虫态为高龄若虫。近 15 天全市监测点每日单灯平均诱虫量不足 10 头, 推测外来虫源尚未迁

请各镇(街)于 3-5、9-11 月落实红火蚁统一防控行动。

入为害。需重点关注通风透光不良、渍水明显的田块，严防倒伏，以免增加稻飞虱爆发风险。

四、稻纵卷叶螟，预计局部中等发生。调查点稻纵卷叶螟零星发生，优势虫态为蛹和成蛾，一般田块鲜见卷叶，亩蛾量为 200-500 头；防效较差田块的卷叶率达 3%、亩蛾量达 5000 头（水口黎村、龙胜和兴、百合儒西、赤水羊路）。近 15 天各监测点每日单灯诱虫量和性诱剂诱捕器虫量均不足 40 头，推测外来虫源尚未迁入为害。建议对防效较差田块及相邻迟栽田适时开展防控。

五、钻蛀性螟虫，预计局部偏轻发生。调查点钻蛀性螟虫零星发生，优势种为二化螟，优势虫态为高龄幼虫，仅发现 1 块田枯鞘率较高，达 1%（马冈横安）。近 15 天各监测点每日单灯诱虫量和性诱剂诱捕器虫量均不足 20 头，推测外来虫源尚未迁入为害。建议对枯鞘率达 1%的田块适时开展防控。

六、稻瘟病，预计偏轻发生。调查点未现发病。

七、防治意见

当前病虫害发生程度较轻，重点防治田块为早栽田。建议对纹枯病、稻粉虱、稻飞虱、稻纵卷叶螟、钻蛀性螟虫等实施挑治；对稻瘟病发病田块及历史稻瘟病区，要做好预防工作。施药亩用量建议如下：

1.防治稻粉虱，使用 50%二嗪磷 100 毫升、或 20%噻虫嗪•26.7%杀虫环 33 克、或 17%氟吡呋喃酮 20 毫升、或 25%噻虫嗪 50 毫升、或 25%扑虱灵 50 毫升、或 50%呋虫胺 12 克。

2.防治稻飞虱、叶蝉，使用 10%三氟苯嘧啶 10 毫升、或 25%噻嗪酮 40 克、或 25%噻虫嗪 4 克、或 25%烯啶虫胺 20 克、或 25%吡蚜酮 20 克。

3.防治稻纵卷叶螟、钻蛀性螟虫，使用 10%四氯虫酰胺 20 克、或 6%乙基多杀菌素 30 毫升、或 15%茚虫威 12 毫升、或 20%氯虫苯甲酰胺 10 克、或 5%甲维盐 100 毫升、或 1.8%阿维菌素 100 毫升。

4.防治纹枯病，使用 19%啉氧•丙环唑 67 毫升、或 32.5%嘧菌酯•苯醚甲环唑 30 毫升、或 30%苯醚甲环唑•丙环唑 15 毫升、或 50%噻呋•己唑醇 10 克、或 20%井冈霉素 50 克。

5.防治稻瘟病、胡麻叶斑病，使用 9%吡唑醚菌酯 60 克、或 50%嘧菌酯 40 克、或 75%三环唑 30 克、或 40%稻瘟灵 80 毫升、或 20%春雷霉素 15 克。

请各镇（街）于 3-5、9-11 月落实红火蚁统一防控行动。